

Übungen zur Höheren Mathematik 3 Serie 05 vom 09. November 2009

Teil A

Aufgabe A15 Zeigen Sie, dass das uneigentliche Parameterintegral $F : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x) := \int_0^{\infty} x e^{-x^2 y^2} dy$$

konvergiert, aber nicht gleichmäßig konvergiert.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ verwenden.

Aufgabe A16 Zeigen Sie, dass das uneigentliche Parameterintegral $F : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(t) := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos(xt) dx$$

gleichmäßig konvergiert.

Aufgabe A17 Seien die Raumkurve $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ parametrisiert durch $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\gamma(t) := (\cos(\pi t), 2 \sin(\pi t), t)$$

und das Vektorfeld $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch

$$f(x, y, z) := \left(-yz e^{x^2}, xz e^{z^2}, \arctan \left(x^2 + \frac{1}{4} y^2 + z \right) \right).$$

Berechnen Sie das Kurvenintegral

$$\int_{\Gamma} f \cdot d\gamma.$$

Aufgabe A18 Untersuchen Sie, ob das Kurvenintegral

$$I := \int_{\Gamma} (|y - z| dx - |z - x| dy + |x - y| dz) \quad (\text{mit } \Gamma \text{ Kurve im } \mathbb{R}^3)$$

vom Weg unabhängig ist und bestimmen Sie seinen Wert für die Kurve

$$\Gamma : \gamma(t) = (\cos t, \sin t, \sin t), 0 \leq t \leq \pi.$$

Teil B

Aufgabe B18 Zeigen Sie, dass das uneigentliche Parameterintegral $G : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$G(t) := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} x \sin(xt) dx$$

gleichmäßig konvergiert.

Aufgabe B19 Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \left(\int_0^{\infty} f(x, y) dy \right) dx \neq \int_0^{\infty} \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy$$

für $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $f(x, y) := (2 - xy)xy e^{-xy}$, gilt. Warum ist dies kein Widerspruch zu Satz 6.4?

Aufgabe B20 Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und die ebene Kurve $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ parametrisiert durch $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\gamma(t) := (\cos(t), \sin(t))$$

und das Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$f(x, y) := \left(\frac{\alpha x - \beta y}{x^2 + y^2}, \frac{\alpha y + \beta x}{x^2 + y^2} \right).$$

Berechnen Sie das Kurvenintegral

$$\int_{\Gamma} f \cdot d\gamma.$$

Aufgabe B21 Sei $G := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > 0\}$ und

$$I(\Gamma) := \int_{\gamma} \frac{y}{9x^2 + 4y^2} dx - \frac{x}{9x^2 + 4y^2} dy$$

ein Kurvenintegral in G .

- Sei Γ_1 die negativ orientierte Ellipse $\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1$. Berechnen Sie $I(\Gamma_1)$.
- Ist $I(\Gamma)$ in G vom Weg unabhängig?

Satz 6.2:

$$f: [c, d] \times [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

$$\int_a^\infty g(y) dy \text{ konv. } |f(x, y)| \leq g(y) \\ \forall (x, y) \in [c, d] \times [a, \infty)$$

$$\Rightarrow \int_a^\infty f(x, y) dy \text{ konv. glim. auf } [c, d]$$

6.3. Satz

$$f: [c, d] \times [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

$$F(x) = \int_a^\infty f(x, y) dy \text{ glim. konv. auf } [c, d]$$

$$\Rightarrow F: [c, d] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

A75.1) $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_0^\infty x e^{-x^2 y^2} dy$

1.) für jedes x konv. $F(x)$.

2.) $F(x)$ ist nicht glim. konv.

Beweis:

$$1.) F(x) = \int_0^\infty x \cdot e^{-x^2 y^2} dy$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x e^{-x^2 y^2} dy$$

$$z = xy$$

$$\frac{dz}{dy} = x \Rightarrow dy = \frac{dz}{x}$$

Hinweis:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^{x-b} x \cdot e^{-z^2} \frac{dz}{x} \\
 &= \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{-z^2} dz & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -\int_0^{\infty} e^{-z^2} dz & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \sqrt{\frac{\pi}{2}} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -\sqrt{\frac{\pi}{2}} & x < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\underline{= \operatorname{sgn}(x) \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}}$$

d.h. für alle $x \in [-1, 1]$
 konvergiert das Integral.

2.) Da $f(x, y) = x \cdot e^{-x^2 y^2}$ stetig auf \mathbb{R}^2 und
 F nicht stetig in 0
 G.2. $\Rightarrow F$ ist nicht gleichmäßig konvergent \square

A16.) Das unecht. Parameter Integral

$$F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_0^{\infty} e^{-y^2} \cos(xy) dy$$

ist glm. konvergent.

dazu $f(x, y) = e^{-y^2} \cos(xy)$, $g(y) = e^{-y^2}$

f ist stetig auf ganz \mathbb{R}^2 , und

$$|f(x, y)| = |e^{-y^2} \cos(xy)| \leq e^{-y^2} = g(y)$$

$$\forall y \in [0, \infty) \forall x \in [-1, 1]$$

Weiterhin (Hinweis A15)

$$\int_0^{\infty} g(y) dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

d.h. mit Satz G.2. folgt, dass

$$F(x) = \int_0^{\infty} e^{-y^2} \cos(xy) dy \text{ glm. } \text{ auf } [-1, 1] \text{ konvergiert. } \square$$

1.2. Satz Γ reg. Kurve, d.h. es ex.

Par. $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$;

γ stetig diff'bar, $\|\gamma'(t)\| \neq 0 \quad \forall t \in [a, b]$,

γ ist doppelpunktfrei.

f in einer Umg. von Γ def. und stetig

$\Rightarrow \int_{\Gamma} f dx$ existiert und

$$\int_{\Gamma} f dx = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

A17.) Sei Γ die Kurve die parametrisiert

ist durch $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$t \mapsto (\cos(\pi t), 2 \sin(\pi t), t)$

und das Vektorfeld

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -yze^{z^2} \\ xze^{z^2} \\ \arctan(x^2 + \frac{1}{4}y^2 + z) \end{pmatrix}$$

Aufgabe: Berechne

$$\int_{\Gamma} f d\gamma$$

dazu 1.) überprüfe vor für Satz 1.2

- γ ist stetig diff'bar

- $\gamma'(t) = (-\pi \sin(\pi t), 2\pi \cos(\pi t), 1)$

- $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\pi^2 \sin^2(\pi t) + 4\pi^2 \cos^2(\pi t) + 1} \neq 0 \quad \forall t$

- $\gamma(t_1) = \gamma(t_2) \Rightarrow t_1 = t_2$

$\Rightarrow t_1 = t_2$, d. h. Doppelpunktbes

\Rightarrow ~~regulär~~ Γ regulär

- f ist als Produkt und Komposition von stetigen Fkt.

2.) Satz (1.2) sagt ~~es~~ $\int_{\Gamma} f dz$ ex. und

$$\int_{\Gamma} f dz = \int_0^1 f(x(t)) \cdot x'(t) dt$$

$$= \int_0^1 \begin{pmatrix} -2 \sin(\pi t) t e^{t^2} \\ \cos(\pi t) t e^{t^2} \\ \arctan(\underbrace{\cos^2(\pi t) + 4 \frac{1}{4} \cdot \sin^2(\pi t) + t^2}_{=1}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\pi \sin(\pi t) \\ 2\pi \cos(\pi t) \\ 1 \end{pmatrix} dt = 1$$

$$= \int_0^1 [2\pi \cdot \sin^2(\pi t) t \cdot e^{t^2} + 2\pi \cos^2(\pi t) t e^{t^2} + \arctan(1+t^2)] dt$$

$$= \int_0^1 [2\pi t e^{t^2} + \arctan(1+t^2)] dt$$

$$= \left[\pi \cdot e^{t^2} \right]_0^1 + \left[(1+t^2) \arctan(1+t^2) - \frac{1}{2} \ln(1+(1+t^2)^2) \right]_0^1$$

$$= \pi e - \pi + 2 \cdot \arctan(2) - \frac{1}{2} \ln(5) - \underbrace{\arctan(1)}_{\pi/4} + \frac{1}{2} \ln(2)$$


$$= \underline{\underline{\pi \cdot (e - \frac{5}{4}) + 2 \cdot \arctan(2) + \frac{1}{2} \ln(\frac{2}{5})}} \quad \square$$

A18.) 1.) Ist $\int_{\Gamma} [(y-z)dx - (z-x)dy + (x-y)dz]$
 wegunabhängig? $\left. \begin{matrix} a(x,y,z) & b(x,y,z) & c(x,y,z) \end{matrix} \right\}$

2.) Welchen Wert besitzt das Integral für $\Gamma = \gamma: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t/2 \end{pmatrix}$?

dazu:

1.) Gebiet $G := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x > y > z \right\}$
 ist einfach zusammenhängend.



auf \bar{G} ist $f = (a, b, c)$ wegen $*$
 C^1 -Vektorfeld (d.h. stetig diff'bar)

Satz 2.4.

Das Integral ist unabh. vom Weg

$(\Leftrightarrow) \text{rot}(f) = \underline{0}$

Berechne $\text{rot}(f)$

$$\begin{aligned} \text{rot}(f) &= \nabla \times f = \begin{pmatrix} \partial_1 \\ \partial_2 \\ \partial_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \partial_2 c - \partial_3 b \\ \partial_3 a - \partial_1 c \\ \partial_1 b - \partial_2 a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ -1 - 1 \\ -1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \neq \underline{0} \end{aligned}$$

\Rightarrow Das Integral ist nicht wegunabh.

2.) Prüfe Voraussetzung von Satz 2.7.2.

- γ stetig diff'bar

$$- \|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t) + \cos^2(t)} = \sqrt{1 + \cos^2(t)} \neq 0 \quad \forall t$$

- γ ist Doppelpunktfrei, da

$(\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, \pi]$ ein Halbkreis ist.

$\Rightarrow \Gamma$ ist reguläre Kurve

$f(x, y, z) = (|y-z|, |x-z|, |y-x|)$ ist stetig auf \mathbb{R}^3 .

S. 7.2.
 $\Rightarrow \int_{\Gamma} \underline{f} \cdot d\underline{\gamma}$ ex:

$$= \int_0^{\pi} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

$$= \int_0^{\pi} \begin{pmatrix} |\sin(t) - \sin(t)| \\ |-1 + \cos(t) - \sin(t)| \\ |\sin(t) - \cos(t)| \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{\pi} \underbrace{[0, -\cos(t) |\cos(t) - \sin(t)| + \cos(t) |\sin(t) - \cos(t)|]}_{=0} dt$$

$$= \int_0^{\pi} 0 dt = \underline{\underline{0}} \quad \square$$