

Übungen zur Höheren Mathematik 3 Serie 06 vom 16. November 2009

Teil A

Aufgabe A19 Mit dem ersten Hauptsatz über Kurvenintegrale beweise man, dass

$$I(\Gamma) = \int_{\Gamma} 3(x-y)|x-y|dx + 3(y-x)|y-x|dy$$

für jede reguläre Kurve Γ im \mathbb{R}^2 vom Weg unabhängig ist. Man berechne $I(\Gamma)$ für

$$\Gamma : \gamma(t) = (\cos(\pi t) + t, t - \sin(2\pi t)), \quad 1 \leq t \leq 4.$$

Aufgabe A20

(a) Gegeben sei die Abbildung

$$T : \mathbb{R} \setminus \{0\} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x^*, y^*) := (x^* - x^*y^*, x^*y^*) = (x, y).$$

Man berechne die inverse Abbildung T^{-1} und

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x^*, y^*)} \right| = |\det DT(x^*, y^*)|.$$

(b) Es sei G das Gebiet, welches von den Geraden $x + y = 1$, $x + y = 2$, $x = 0$ und $y = 0$ begrenzt wird sowie den Punkt $x = \frac{1}{2}, y = 1$ enthält. Man berechne das Bild von G unter der Abbildung T^{-1} .

(c) Man berechne

$$\int_G e^{\frac{y}{x+y}} dx dy.$$

Aufgabe A21 Gegeben sei das Gebiet $G := \{(x, y) \mid x > 0, |y| < x^2 + y^2 < 1\}$. Skizzieren Sie G in der x, y -Ebene und berechnen Sie das Integral

$$\int_G \frac{x}{(x^2 + y^2)^2 + 1} dx dy.$$

Aufgabe A22 Es seien α, β reelle Zahlen mit $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$. Berechnen Sie das Volumen des von den Flächen

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2z, \quad x^2 + y^2 = z^2 \cdot \tan^2 \alpha \quad \text{und} \quad x^2 + y^2 = z^2 \cdot \tan^2 \beta$$

begrenzten Körpers.

Teil B

Aufgabe B22 Sei Γ die aus den (orientierten!) Strecken

$$\Gamma_1 = \overline{(0,0)(1,1)}, \Gamma_2 = \overline{(1,1)(-1,1)}, \Gamma_3 = \overline{(-1,1)(0,0)}$$

zusammengesetzte Kurve $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3$. Mittels des Integralsatzes von Gauß berechne man das Kurvenintegral

$$\int_{\Gamma} \left(\frac{8}{3}x^3 - 16xy^2 + e^{y^2} \right) dy + \left(\arctan(x^2 + \sin x) - 6xy^2 \right) dx.$$

Aufgabe B23 Gegeben sei das Quadrat $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y - 2| < 1\}$.

(a) Durch die Koordinatentransformation

$$T : Q \rightarrow Q^* \subset \mathbb{R}^2, (u, v) = T(x, y) := (x - y, x + y), (x, y) \in Q,$$

wird Q eindeutig auf ein Gebiet Q^* abgebildet. Man gebe die Abbildung T^{-1} an und beschreibe Q^* durch geeignete Ungleichungen.


(b) Berechnen Sie $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \det D(T^{-1})(u, v) \right|$ und $\int_Q \frac{(x - y)^3}{(x + y)^2} dx dy$, indem Sie mittels der Abbildung T die neuen Koordinaten u, v einführen.

Aufgabe B24 Sei $a > 0$. Mithilfe von Polarkoordinaten berechne man den Flächeninhalt des (ebenen) Gebiets G , welches von der Kurve $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, $(x \geq 0)$ begrenzt wird.

B22.)

$$\int_T \underbrace{\left(\frac{8}{3}x^3 - 16xy^2 + e^{y^2}\right)}_{a(x,y)} dy + \underbrace{\left(\arctan(x^2 + \sin(x)) - 6xy^2\right)}_{b(x,y)} dx$$

$$T = T_1 + T_2 + T_3$$



Satz von Green 2.3.

Sei $G \subset \mathbb{R}^2$ ein Gebiet, das von k geschlossenen regulären Kurven T_1, \dots, T_k mit $T_i \cap T_j = \emptyset$ berandet wird; diese seien so orientiert, dass G jeweils zur Linken liegt, wenn T_i im positiven Sinn durchlaufen wird.

Dann gilt:

$$\iint_G \left(\frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y}\right) dx dy = \sum_{i=1}^k \oint_{T_i} a dy - b dx = \oint_{\partial G} a dy - b dx$$

$a(x,y)$ und $b(x,y)$ sind stetig diff'bar.

$$G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, 0 < y < 1, -y < x < y\}$$

G ist offen und zusammenhängend.

$T = \partial G$ ist reguläre Kurve und durchläuft man T im positiven Sinn, liegt G zur Linken.

$$a(x,y) := \frac{8}{3}x^3 - 16xy^2 + e^{y^2}$$

$$b(x,y) := -\arctan(x^2 + \sin(x)) + 6xy^2$$

a und b sind stetig diff'bar auf \overline{G}

$$\int_{\Gamma} a(x,y) dy - b(x,y) dx = \iint_G \left(\frac{\partial a}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial b}{\partial y}(x,y) \right) dx dy$$

$$\frac{\partial a}{\partial x}(x,y) = 8x^2 - 16y^2$$

$$\frac{\partial b}{\partial y}(x,y) = 12xy$$

$$\int_0^1 \int_{-y}^y 8x^2 - 16y^2 + 12xy \, dx \, dy$$

$$= \int_0^1 \left. \frac{8}{3}x^3 - 16xy^2 + 6x^2y \right|_{-y}^y dy$$

$$= \int_0^1 \left. \frac{8}{3}y^3 - 16y^3 + 6y^3 + \frac{8}{3}y^3 - 6y^3 \right| dy$$

$$= \int_0^1 \frac{16}{3}y^3 - 32y^3 \, dy = ~~\frac{80}{3}~~ - \frac{80}{3} \int_0^1 y^3 \, dy$$

$$= -\frac{80}{3} \cdot \frac{1}{4} = \underline{\underline{-\frac{20}{3}}}$$

B 23.1

~~Trans~~ Transformationsatz für Gebietsintegrale
(3.1.)

Vor.: Q und Q^* ebene Gebiete mit ∂Q und ∂Q^* (1) regulär. Es gibt umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen $(x,y) \in Q$ und $(u,v) \in Q^*$

$$T: Q \rightarrow Q^*, T(x,y) := \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

$$(T^{-1}: Q^* \rightarrow Q, T^{-1}(u,v) = (x,y))$$

(2) ∂Q auf ∂Q^* abbilden, so dass Durchkreuzungen erhalten bleibt.

$$\det(D(T^{-1})) = \left| \frac{\partial(\bar{T}_1^{-1}, \bar{T}_2^{-1})}{\partial(u,v)} \right| = \det \left\{ \begin{array}{cc} \frac{\partial T^{-1}}{\partial u} & \frac{\partial T^{-1}}{\partial v} \\ \frac{\partial T^{-2}}{\partial u} & \frac{\partial T^{-2}}{\partial v} \end{array} \right\} > 0$$

$\forall (u,v) \in \overline{Q^*}$


(3) T, T^{-1} stetig diff'bar.

Satz: $f: \overline{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ auf \overline{Q} stetig (4)

$$\iint_Q f(x,y) dx dy = \iint_{Q^*} f \circ T^{-1}(u,v) \cdot |\det(D(T^{-1}))(u,v)| du dv$$

a) $Q = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y-2| < 1\}$

$$T: Q \rightarrow Q^*, T(x,y) := (u,v) = \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix}$$



Rand von ∂Q wird auf ∂Q^* abgebildet

$$\partial Q: (i) \{x+y-2=1\} = \{x+y=3\}$$

$$(ii) \{x-y+2=1\} = \{x-y=-1\}$$


$$(iii) \{-x+y-2=1\} = \{x-y=-3\}$$

$$(iv) \{-x+2-y=1\} = \{x+y=1\}$$

$$\Gamma(\{x+y=3\}) = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ 3 \end{pmatrix}, u \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\Gamma(\{x-y=-1\}) = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ v \end{pmatrix} \right\}, \Gamma(\{x-y=-3\}) = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ v \end{pmatrix} \right\},$$

$$\Gamma(\{x+y=1\}) = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$



$$\Gamma(0,2) = \begin{pmatrix} 0-2 \\ 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Q^* = \left\{ (u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid -3 < u < -1, 1 < v < 3 \right\}$$

Γ^{-1} ist gesucht.

$$\Gamma^{-1}(u,v) = \Gamma^{-1}(x-y, x+y) \\ \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = u + y \quad \text{und} \quad v = u + 2y \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}(v-u)$$

$$\Rightarrow x = u + \frac{1}{2}v - \frac{1}{2}u = \frac{1}{2}(u+v)$$

$$\Rightarrow \underline{\Gamma^{-1}(u,v) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} u+v \\ v-u \end{pmatrix}}$$

b.) ∂Q und ∂Q^* regulär, $T: Q \rightarrow Q^*$ bijektiv,

Γ, Γ^{-1} stetig diff'bar $f: Q \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{(x-y)^2}{(x+y)^2}$

stetig auf \bar{Q} .

$\Rightarrow \Gamma$ rekt. anwendbar.

$$\int_Q f(x,y) dx dy = \int_{Q^*} f \circ T^{-1}(u,v) \cdot |\det(D(T^{-1}))(u,v)| du dv \quad (*)$$

$$|\det(D(T^{-1}))(u,v)| = \left| \det \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2}$$

$$f \circ T^{-1}(u,v) = f\left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(v-u)\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}(u+v-v+u)\right)^3}{\left(\frac{1}{2}(u+v+v-u)\right)^2} = \frac{u^3}{v^2}$$

$$(*) \int_{-3}^{-1} \int_{-3}^{-1} \frac{u^3}{v^2} dv du = \int_{-3}^{-1} \frac{u^3}{2} \left[-\frac{1}{v} \right]_{-3}^{-1} du$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-3}^{-1} u^3 \cdot \frac{2}{3} du = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{4} u^4 \right]_{-3}^{-1} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{4} - \frac{81}{4} \right]$$

$$= -\frac{20}{3}$$

24.) ges.: $|G| = \int_G 1 dx dy$ begrenzt durch

$$\text{Kurve } K: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

K in Polar koordinaten: $(x = r \cdot \cos(\varphi), y = r \cdot \sin(\varphi))$

$$(r^2 \cos^2(\varphi) + r^2 \sin^2(\varphi))^2 = a^2 r^2 (\cos^2(\varphi) - \sin^2(\varphi))$$

$$\Leftrightarrow r^4 = a^2 r^2 (1 - 2 \sin^2(\varphi))$$

$$\Leftrightarrow r^4 = a^2 r^2 \cos(2\varphi) \Rightarrow \underline{r = a \sqrt{\cos(2\varphi)}} \quad \varphi \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$$

Parametrisierung: γ von $K = \partial G$

$$\gamma: \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi \mapsto \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$|G| = \int_G 1 dx dy = \int_G \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dx dy$$

$$= \int_{\partial G} \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \quad (*)$$

$$x = r \cdot \cos(\varphi) = a \sqrt{\cos(2\varphi)} \cdot \cos(\varphi)$$

$$\frac{dx}{d\varphi} = a \cdot \left(\frac{1}{2 \sqrt{\cos(2\varphi)}} \cdot (-\sin(2\varphi)) \cdot 2 \cdot \cos(\varphi) - a \cdot \sqrt{\cos(2\varphi)} \cdot \sin(\varphi) \right)$$

$$\frac{dx}{d\varphi} = \left(\frac{-a \cdot \sin(2\varphi) \cos(\varphi)}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} - a \sqrt{\cos(2\varphi)} \sin(\varphi) \right)$$

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{-a \cdot \sin(2\varphi) \sin(\varphi)}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} + a \sqrt{\cos(2\varphi)} \cos(\varphi)$$

$\pi/4$

$$(*) = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\frac{1}{2} \left(a \sqrt{\cos(2\varphi)} \cos(\varphi) \right) \left(\frac{-a \cdot \sin(2\varphi) \cos(\varphi)}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} + a \sqrt{\cos(2\varphi)} \cos(\varphi) \right) - \frac{1}{2} \left(a \sqrt{\cos(2\varphi)} \sin(\varphi) \right) \left(\frac{-a \sin(2\varphi) \sin(\varphi)}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} - a \sqrt{\cos(2\varphi)} \sin(\varphi) \right) \right) d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2 \cos^2(2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left[\frac{1}{2} \sin(2\varphi) \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{a^2}{2}$$

Übungen zur Höheren Mathematik 3 Serie 07 vom 23. November 2009

Teil A

Aufgabe A23 Gegeben sei die Kurve

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 + y^2 - 2x)^2 = x^2 + y^2\}.$$

Die Kurve K besteht aus zwei geschlossenen, doppelpunktfreien Kurven K_1, K_2 . Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Gebietes G , das zwischen K_1 und K_2 liegt.

Aufgabe A24 Beweisen Sie, dass sich die Gleichung

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 2x)^2 - (x^2 + y^2) = 0$$

in einer Umgebung $U((0, 1))$ nach y auflösen lässt. D.h. es existiert eine Funktion $f = f(x)$, so dass

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{in} \quad |x| < \delta_0, \quad \text{für} \quad \delta_0 > 0$$

geeignet. Berechnen Sie ferner $f'(0)$.

Aufgabe A25 Berechnen Sie den Flächeninhalt des Teils des Doppel-Kegels $y^2 + z^2 = x^2$, der im Inneren des Zylinders $x^2 + y^2 = 1$ liegt.

Aufgabe A26 Es sei

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

die Einheitssphäre und

$$p : [0; 2\pi] \times [0; \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\varphi, \theta) \mapsto (\sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi \sin \theta, \cos \theta)$$

eine Parametrisierung dieser Fläche. Zeigen Sie, dass es sich damit dabei um eine reguläre Fläche (Parametrisierung) handelt.

Teil B

Aufgabe B25 Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$f(x, y) = e^x - y^2.$$

Untersuchen Sie die Auflösbarkeit der Gleichung $f(x, y) = 0$, d.h. bestimmen Sie diejenigen Punkte x_0 bzw. y_0 zu denen eine Umgebung $U(x_0)$ bzw. $U(y_0)$ existiert, so dass in diesen Umgebungen jeweils gilt:

$$f(x, g(x)) = 0 \quad \forall x \in U(x_0) \quad \text{für eine Funktion } g : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$$

bzw.

$$f(h(y), y) = 0 \quad \forall y \in U(y_0) \quad \text{für eine Funktion } h : U(y_0) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Aufgabe B26 Gegeben sei die reguläre Fläche

$$\mathcal{F} := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in G\}.$$

dabei ist $G \subset \mathbb{R}^2$ das Gebiet, dessen positiv orientierter Rand mit der Kurve

$$K : x = \cos^2(t), \quad y = \sin(t) \cos(t), \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

zusammenfällt.

Berechnen Sie den Flächeninhalt von \mathcal{F} .

Aufgabe B27 Berechnen Sie den Flächeninhalt des Stückes der Fläche $z = 2x^2 - 8xy - 2y^2$, das von dem Zylinder $x^2 + y^2 = 1$ ausgeschnitten wird.

Aufgabe B28 Es sei

$$Z := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, |z| \leq 1\}$$

die Mantelfläche eines Zylinders und

$$p : [0; 2\pi] \times [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\varphi, z) \mapsto (\sin \varphi, \cos \varphi, z)$$

eine Parametrisierung dieser Fläche. Zeigen Sie, dass es sich damit dabei um eine reguläre Fläche (Parametrisierung) handelt.