

Übungen zur Höheren Mathematik 3 Serie 14 vom 25. Januar 2010

Teil A

Aufgabe A51

- a) Die Zufallsvariable X beschreibe die mit einem idealen Würfel geworfene Augenzahl. Man berechne den Erwartungswert $E(X)$.
- b) Jemand bietet gegen jeweils 50 Euro Einsatz folgende Spiele an

Spiel 1: Würfeln mit 3 Würfeln. Die fünffache Augensumme wird in Euro ausgezahlt.

Spiel 2: Würfeln mit 4 Würfeln. Die dreifache Augensumme wird in Euro ausgezahlt.

Auf welches Spiel kann man sich mit Aussicht auf Gewinn einlassen?

Aufgabe A52 In einem Spiel werden zwei Kartenstapel mit jeweils n von 1 bis n nummerierten Karten gemischt und die Karten anschliessend paarweise (eine Karte aus dem einen und eine aus dem anderen Stapel) nebeneinander gelegt. Für jedes Paar, für das beide Karten die gleiche Zahl zeigen, werden 10 Euro gezahlt. Für alle Paare, für die beide Karten unterschiedliche Zahlen zeigen, werden 1 Euro von der Gewinnsumme abgezogen (eine negative Gewinnsumme wird zugelassen). Die Zufallsvariable X bezeichne die Gewinnsumme. Bestimmen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

Aufgabe A53 Beim kontinuierlichen Roulette erfolgt die Ausspielung mit Hilfe eines drehbaren Zeigers. Die Zufallsvariable X bezeichne den Winkel im Intervall $[0, 2\pi)$ des Zeigers. Jeder Winkel ist gleich wahrscheinlich. Berechnen Sie die Verteilungsfunktion F_X , die Dichte f_X , den Erwartungswert $E(X)$ und die Varianz $\text{Var}(X)$ von X .

Aufgabe A54 Es sei $\rho > 0$. Die Zufallsvariable X besitze die Dichte

$$f(x) = ce^{-\rho|x|} \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

- a) Bestimmen Sie c .
- b) Berechnen Sie die Verteilungsfunktion F_X , den Erwartungswert $E(X)$ und die Varianz $\text{Var}(X)$ von X .

Teil B

Aufgabe B50 Als Spiel wird der Wurf mit 4 idealen Münzen und folgenden Gewinnmöglichkeiten angeboten:

- zeigt genau eine Münze das Wappen, so erhält man 1 Euro;
- zeigen genau zwei Münzen das Wappen, so erhält man 2 Euro;
- zeigen genau drei Münzen das Wappen, so erhält man 3 Euro;
- zeigen genau vier Münzen das Wappen, so erhält man 4 Euro.

Die diskrete Zufallsvariable X bezeichne den Gesamtgewinn (ohne Einsatz) bei diesem Spiel. Bestimmen Sie den Erwartungswert $E(X)$, Varianz $\text{Var}(X)$ und die Verteilungsfunktion F_X .

Aufgabe B51 Die Zufallsvariable X besitze die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x) & \text{für } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- a) Bestimmen Sie c .
- b) Berechnen Sie die Verteilungsfunktion F_X , den Erwartungswert $E(X)$ und die Varianz $\text{Var}(X)$ von X .

Aufgabe B52 Aus einem Teig mit r Rosinen werden n Brötchen gebacken. Jede der möglichen Verteilungen der Rosinen auf die n Brötchen ist gleich wahrscheinlich. Brötchen mit Rosinen werden für 50 Cent und Brötchen ohne Rosinen für 20 Cent verkauft. Die Zufallsvariable X bezeichne die Gesamteinnahme. Bestimmen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

Hinweis: Bezeichnen Sie mit X_i eine Zufallsvariable, die den Wert 0 annimmt, wenn das i 'te Brötchen keine Rosine enthält, und den Wert 1 sonst. Berechnen Sie zuerst $E(X_i)$ und $E(X_i X_j)$.

Q50.1

* Im diskreten W'keitsraum, X, Y , Zufallsvariable:

$$E(X) = \sum_{\omega_i \in \Omega} X(\omega_i) p(\omega_i)$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad E(c \cdot X) = c \cdot E(X)$$

$$\text{Var}(X) = E((X - EX)^2) = E(X^2) - \cancel{E(X)^2} (EX)^2$$

$$F_X(t) = P(\{\omega, X(\omega) \leq t\})$$

$$F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} p(\omega_i)$$

Ereignisse: ω_0 = keine Münze zeigt Wappen

ω_1 = genau eine Münze zeigt Wappen

ω_2 = genau zwei " - "

ω_3 = " drei " - "

ω_4 = " vier " - "

$$\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

W'keit der Ereignisse ω_i :

$$P(\omega_0) = \binom{4}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

$$P(\omega_1) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}$$

$$P(\omega_2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

$$P(\omega_3) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{4}$$

$$P(\omega_4) = \binom{4}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{16}$$

Zufallsvari. der Gesamtgewinn bezeichnet

$$x(\omega_i) = \begin{cases} 0, & i=0 \\ 1, & i=1 \\ 2, & i=2 \\ 3, & i=3 \\ 4, & i=4 \end{cases} \quad \text{ges.: } E(x), \text{Var}(x), F_x(t)$$

$$E(x) = \sum_{\omega_i \in \Omega} x(\omega_i) \cdot p(\omega_i)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{16} = \underline{\underline{2}}$$

$$\text{Var}(x) = E((x - E(x))^2)$$


$$= \sum_{\omega_i \in \Omega} (x - 2)^2 \cdot p(\omega_i)$$

$$= (0-2)^2 \cdot \frac{1}{16} + (1-2)^2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{16} \cdot 4 = \underline{\underline{1}}$$

Verteilungsfunktion

$$F_x(t) = p(\{\omega_i, x(\omega_i) \leq t\})$$

$$F_x(t) = \begin{cases} 0, & -\infty < t \leq 0 \\ 1/16, & 0 \leq t < 1 \\ 5/16, & 1 \leq t < 2 \\ 11/16, & 2 \leq t < 3 \\ 13/16, & 3 \leq t < 4 \\ 1, & 4 \leq t < \infty \end{cases}$$



B 51.1

* X stetige Zufallsvariable, $f(x)$ Dichte fkt.:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 (f(x)) dx$$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

ZV X hat Dichte $f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

a.) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$$1 = \int_0^1 cx(1-x) dx = c \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = c \frac{1}{6}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{c=6}}$$

b.) ges.: $F_X(t), E(X), \text{Var}(X)$

(i) $t < 0$: $F_X(t) = \int_{-\infty}^t 0 dx = \underline{0}$

(ii) $t \in [0, 1]$: $F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^0 0 dx}_{=0} + \int_0^t 6x(1-x) dx$


$$= 6 \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right) = \underline{3t^2 - 2t^3}$$

(iii.) $t > 1$: $F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 f(x) dx + \int_1^t 0 dx$$

$$= 0 + 1 + 0 = \underline{\underline{1}}$$

$$\Rightarrow F_X(t) = \begin{cases} 0 & t \in (-\infty, 0] \\ 3t^2 - 2t^3 & t \in (0, 1] \\ 0 & t \in (1, \infty) \end{cases}$$



über die Funktionen,
suchen wir irgendeinen
Graph

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = 6 \int_0^1 x^2 - x^3 dx = 6 \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

$$\begin{aligned} E(x^2) &= 6 \int_0^1 x^3 (1-x) dx = 6 \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{5} x^5 \right]_0^1 \\ &= 6 \cdot \frac{1}{20} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

$$\text{Var}(x) = \frac{3}{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{20}$$

* Urnenmodelle (einmalige Stichprobenverfahren)

- Eine Urne enthält n nummerierte Kugeln
- Ziehen von k Kugeln unter Bedingungen:

Ziehenfolge	mit zurücklegen	ohne
mit	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ohne	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

} Gleichzeit

* Multisetmodell - Verteilen von k Murmeln auf n Zellen

Mehrfachbelegung	unterschiedliche Murmeln	
	ja	nein
mit	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
ohne	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$