

Eine Abbildung  $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$   
 heißt Norm auf  $V$ , falls

(N1)  $\|v\| \geq 0 \quad \forall v \in V$  und  $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$

(N2)  $\forall a \in \mathbb{R}, v \in V$  gilt:

$\|a \cdot v\| = |a| \cdot \|v\|$

(N3)  $\forall v, w \in V$  gilt:

$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$

2.18. (Normen)  $x \in \mathbb{R}^2$

i.)  $x \mapsto |x_1|$

(N1) ist nicht erfüllt:  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto |0| = 0$   
 aber  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

ii.)  $x \mapsto 5|x_1| + 2|x_2|$   
 iii.)  $x \mapsto \max(|x_1|, |x_2|)$  }  $\Rightarrow$  analog zu vii.)

iv.)  $x \mapsto x_1 + x_2$  ist keine Norm, da (N1)  
 nicht erfüllt ist:

$x = (0, -1) \mapsto -1 \neq 0$

v.)  $x \mapsto \sqrt{x_1 + x_2}$   
 $x = (-1, -1) \mapsto \sqrt{-2} \notin \mathbb{R}$

vii.)  $x \mapsto \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$  ist Norm, da:

(N1) Sei  $0 \neq x \in \mathbb{R}^2, x_1 \vee x_2 \neq 0, x_1^2 \vee x_2^2 > 0$

$\Rightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} > 0 \quad \forall x \neq 0$

$x = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 0$  ✓

(N2)  $a \in \mathbb{R}$

$\|ax\| = \sqrt{(ax_1)^2 + (ax_2)^2} = a \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = a \cdot \|x\|$  ✓

$$(N3) \quad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= (x_1+y_1)^2 + (x_2+y_2)^2 \\ &= (x_1^2 + x_2^2) + 2 \cdot (x_1 y_1 + x_2 y_2) + (\cancel{x_1^2} + y_2^2) \\ &\leq (x_1^2 + x_2^2) + 2 \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + y_2^2} + (y_1^2 + y_2^2) \\ &\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$


---

vii.)  $x \mapsto |x_1| + |x_2|$  ist eine Norm, da:

$$(N1) \quad \checkmark$$

$$(N2) \quad a \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} \|ax\| &= |ax_1| + |ax_2| = |a| \cdot (|x_1| + |x_2|) \\ &= |a| \cdot \|x\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (N3) \quad \|x+y\| &= |x_1+y_1| + |x_2+y_2| \\ &\leq |x_1| + |y_1| + |x_2| + |y_2| \\ &= \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

viii.)  $x \mapsto \max(|x_1|, |x_2|)$  ist eine Norm, da:

$$(N1) \quad \checkmark$$

$$(N2) \quad a \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} \|ax\| &= \max(|ax_1|, |ax_2|) = |a| \cdot \max(|x_1|, |x_2|) \\ &= |a| \cdot \|x\| \end{aligned}$$

$$(N3) \quad \underline{x, y \in \mathbb{R}^2}$$

$$\begin{aligned} \|x+y\| &= \max(|x_1+y_1|, |x_2+y_2|) \\ &\leq \max(|x_1| + |y_1|, |x_2| + |y_2|) \quad (*) \end{aligned}$$

$$\text{1. Fall: } \|x\| = |x_1| \wedge \|y\| = |y_1|$$

$$\Rightarrow (*) = |x_1| + |y_1| = \|x\| + \|y\|$$

2. Fall:  $\|x\| = |x_1| \wedge \|y\| = |y_2|$

$$\|x+y\| = \max(|x_1+y_1|, |x_2+y_2|)$$


a.) falls  $|x_1+y_1| \geq |x_2+y_2|$

$$\|x+y\| = |x_1+y_1| \leq |x_1| + |y_1| \leq \|x\| + \|y\|$$


b.) falls  $|x_2+y_2| > |x_1+y_1|$

$$\|x+y\| = |x_2+y_2| \leq |x_2| + |y_2| = \|x\| + \|y\|$$

b.1



$$x \mapsto 5|x_1| + 2|x_2|$$



$$x \mapsto \max(4|x_1|, |x_2|)$$

A. 2. 18.

$$A = \begin{pmatrix} 7/4 & 1/\sqrt{2} & -3/4 \\ 1/\sqrt{2} & 5/2 & -1/\sqrt{2} \\ -3/4 & -1/\sqrt{2} & 7/4 \end{pmatrix}$$

$$A \text{ symm.} \Rightarrow \|A\|_\infty = \|A\|_1$$

$$\bullet \left| \frac{7}{4} \right| + \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| + \left| -\frac{3}{4} \right| = \frac{5}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\bullet \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| + \left| \frac{5}{2} \right| + \left| -\frac{1}{2\sqrt{2}} \right| = \frac{5}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \underline{\underline{\frac{5}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}}$$

$$\bullet \left| -\frac{5}{4} \right| + \left| -\frac{1}{2\sqrt{2}} \right| + \left| \frac{7}{4} \right| = \frac{5}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\|A\|_{\infty} = \frac{5}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \|A\|_1$$

$$\|A_2\| = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

$\lambda_{\max}(A^T A) = \lambda^2(A)$  falls  $A$  symm.

sei  $\lambda$  EW von  $A$  mit EV  $v$

$$(A^T A)v = A \cdot Av = A(\lambda v) = \lambda^2 v$$

$$\det(A - \lambda I) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sqrt{\lambda_{\max}^2(A)} \\ = \lambda_{\max}(A) = 3$$

A 2.11.)

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$\tilde{x}$  Näherungswert

für  $x=2$ , mit rel. Fehler

von max. 5%

a) rel. Fehler in  $f(x)$

$$\left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| \leq \text{Krel.}(x) \cdot \sum_{j=1}^n \left| \frac{\tilde{x}_j - x_j}{x_j} \right|$$

$n=1$ :

$$\left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| \leq \text{Krel.}(x) \cdot \left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right|$$

mit  $K_{rel}(x) := \left| f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} \right|$

$$\left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right| \approx 5\%$$

$$K_{rel}(x) = \left| -\frac{2x}{(x^2+1)^2} \cdot \frac{x}{\frac{1}{x^2+1}} \right| = \left| -\frac{2x^2}{x^2+1} \right|$$

$$K_{rel}(x) = \left| -\frac{2x}{(x^2+1)^2} \cdot \frac{x}{\frac{1}{x^2+1}} \right|$$

$$K_{rel}(2) = \left| -\frac{2 \cdot 2^2}{(2^2+1)} \right| = 1,6$$

$$\left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| \leq 1,6 \cdot 5\% = 8\%$$

=> rel. Fehler in  $f$  beträgt 8% [in 1. Näherung]

b.)  $K_{rel}(2,0) \cdot e_x = 1$

$$\Rightarrow 1,6 \cdot e_x = 1$$

$$\Rightarrow e_x = \frac{1}{1,6} = 0,625$$

=> Der rel. Fehler zu  $x$  darf max. 0,625% betragen.

pq-Formel

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

i.)  $p = -123$ ,  $q = 0,4$

$$x_{1/2} = \frac{123}{2} \pm \frac{1}{10} \sqrt{378785}$$

$$x_1 = {}_{10} \sqrt{122.9967475}$$

$$x_2 = 10 \quad 0.003252120000$$

$$x_4 = 4 \quad 0,123 \cdot 10^3$$

$$x_2 = 4 \quad 0$$

Satz von Vieta

$$x_1 + x_2 = -p \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

und vermeiden so Auslöschung:

$$x_1 = -\frac{p}{2} + (\operatorname{sgn}(-p)) \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$x_2 = \frac{q}{x_1}$$

$$1) \quad x_1 = 4 \quad 123.0 \quad ; \quad x_2 = 0,003352$$